

さいこけいしとう  
**柴胡桂枝湯エキス〔細粒〕23**

本方は、桂枝湯と小柴胡湯の合方で、桂枝湯の証である頭痛や悪寒などの風邪の初期症状から小柴胡湯の証である吐き気や食欲不振などを伴う風邪の後期の症状へと病気が移行していく中間の頃の症状に用いられます。

 ●使用上の注意●

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

**次の人は服用しないでください。**

生後3ヵ月未満の乳児



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ●効能・効果●

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：

胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

## ●用法・用量●

次の量を食前又は食間に温湯又は水で服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
大人(15才以上)	1 包	2.0 g	3 回
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g	
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g	
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g	
2才未満	1/4包	0.5 g以下	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

## ●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

サイコ	2.5 g	ニンジン	1.0 g
ハンゲ	2.0 g	タイソウ	1.0 g
ケイヒ	1.25 g	カンソウ	0.75 g
シャクヤク	1.0 g	ショウキョウ	0.33 g
オウゴン	1.0 g		

上記より製した柴胡桂枝湯エキス(「漢方診療医典」、1/2量)3.6g(乾燥物換算で約1.8gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

## ●保管及び取扱い上の注意●

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

(4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。

(5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**  
名古屋市昭和区円上町24-21